

BOLETTINO

DRI

Musei di Zoologia ed Anatomia comparata
della R. Università di Torino


N. 221 pubblicato il 2 Gennaio 1896

VOL. XI

Dr. ACHILLE GRIFFINI

Nuova Pseudofillide del genere SEMILEPTOTETTIX Brunn.

Semileptotettix Salvadorii n. sp. — ♂ — *Pallide viridi-flavescens; statura modica — Corpus agile, pedibus sensim elongatis; primo intuitu glabrum, attamen hinc illinc valde breviter perobsoleteque pubescens — Caput pallidum, obtuse subglobosum; oculis brunneis, globosis, prominulis; antennis basi haud contiguis; fastigio verticis acuminato, brevi, sulcato, basi utrinque subtuberculato — Pronotum totum granulosum, sulcis duobus transversis distinctis, quorum tamen secundus, in medio pronoli situs, magis distinctus et impressus; pronoti metazona aliquantulum assurgit, margine postico late rotundato (quamobrem pronotum subsellatum videtur) et carinula perbrevi longitudinali postica praedita; pronoti margo anticus in medio tuberculo minimo sed acuto praeditus; pronoti lobi laterales multo longiores quam antiores, granulosi, limbatis, margine infero subrecto, angulisque obtusis — Elytra parum coriacea, ut in figura allata confecta et venosa; tympanum in utroque elytro magnum, hyalinum — Alae elytris breviores, pellucidae, laeviter albicans, venis flavidis, margine postico externaque rotundatis — Femora omnia lobis genicularibus utrinque spina praeditis; femora antica subtus in dimidia parte apicali marginis antici (id est interni) 5-6 spinulosa; tibiae anticae superne late sed perparum profunde sulcatae, conchis hiantibus, subtus in utroque margine plurispinulosa, supra spinulis deslitutae; femora intermedia subtus,*



Semileptotettix
Salvadorii ♂
Elytra destra

in dimidia parte apicali marginis antici (idest externi), 4-spinulosa; tibiae intermediae supra, in margine postico (idest interno) 3-spinulosae; femora postica basi incrassata, abdome longiora, subtus 7-spinulosa; tibiae posticae femoribus aequilongae, subprismaticae, marginibus omnibus multispinulosis — Pectus angustum; prosternum bispinosum; metasternum sovea unica fere orbiculari praeditum — Abdomen compressiusculum, omnibus segmentis, ultimo excepto, utrinque macula fusca elongata, verticali (idest transversa), ornatis; segmentum anale magnum, pallide castaneum, villosum, apice truncatum et in medio apicis supra concavo-impressum; segmentum praeanale margine postico lateribus productis, fusco limbatis — Lamina supraanalis villosa, pallide castanea, subrotundata, medio longitudinaliter impresso-sulcata; cerci breves, incurvi, apice spinula nigra praediti; titillator prominulus, compressus, apice clavato, subtruncato, supra rotundato, subtus fere recto; lamina subgenitalis magna, elongata, fere navicularis, attamen haud carinata, ad apicem sensim attenuata, sat profunde rotundato-emarginata, stylis haud longis instructa.

<i>Long. corporis</i>	mm. 33;	<i>long. pronoti</i>	mm. 7,2
» <i>elytrorum</i>	» 34;	<i>latit. elytr. medio</i>	» 8,5
» <i>fem. antic.</i>	» 12,7;	<i>long. fem. postic.</i>	» 26.

Hab. — Brasile — (Un ♂ nelle collezioni del Museo Zoologico di Torino).

Questa specie è ben distinta da quante finora si conoscono, e viene a collocarsi vicino alla *S. triangularis* Br. (1) vivente nel Paraguay.

(1) C. Brunner von Wattenwyl — *Monographie der Pseudophylliden* — Wien, 1895, pag. 227.